



Regiões de adaptação

RS 1 e 2, SC 1 e 2, PR 1 e 2.

ORS 1402

Características agronômicas

Ciclo	PRECOCE*
Estatura de Planta	MÉDIA/ALTA (94cm)
Comportamento ao acamamento	MR/MS
Comportamento a debulha	MR
Crestamento	MR

* Dias da Emergência ao Espigamento: 85 dias; Dias da Emergência a Maturação: 125 dias

Qualidade Industrial

Classificação	Trigo Pão
Força de Glúten (W médio) Dados de 5 anos e 27 localidades)	259
Estabilidade Dados de 5 anos e 27 localidades)	9
Dureza do Grão	DURO
Coloração do Grão	VERMELHO
Peso de mil grãos (média)	34g
Germinação na Espiga	MR/MS

Reação às Doenças

Oídio	MS
Ferrugem da folha	MR/MS
Manchas foliares	MR/MS
Giberela	MR/MS
Brusone	MS/S
Mosaico	MS/S
VNAC	MS
Bacteriose	MS

LEGENDA: AS - Altamente Suscetível; S - Suscetível; MS - Moderadamente Suscetível

MR - Moderadamente Resistente; R - Resistente; SI - Sem Informação

Destaques

- Rendimento
- Precocidade

Sugestões de Cultivo

- Densidade de população de plantas:
Para regiões 1 e 2: 300 a 330 plantas finais/m²
- Tratar as sementes com inseticidas sistêmicos, visando o controle de pulgões
- Indicado uso de regulador de crescimento em solos férteis
- Doença alvo: Oídio
- Manejo de N em pré-espigamento: boa resposta em produtividade e qualidade industrial.